

De har i dag d. _____ fået syet et sår

De skal efterfølgende være opmærksom på følgende:

Tegn på betændelse:

Hævelse, varme, rødme, smerter og feber

Hvis De observerer et eller flere af disse symptomer, skal De henvende Dem til egen læge eller lægevagt .

___ Forbindingen lades urørt det første døgn.
Ved gennemsivning det første døgn bør forbindingen skiftes hér eller af Dem selv. Herefter foregår forbindingsskift hos egen læge/vagtlæge. Evt. plasterstrips eller gittergaze lades urørt.

___ De er blevet syet med ___ sting
Stingene skal fjernes hos egen læge, i dagtid, om ___ dage

Der må ikke rives eller kradses i såret

Hvis såret springer op, skal De kontakte egen læge eller lægevagt

Vi anbefaler at børn har plaster over syningen indtil stingene er fjernet. Grunden hertil er at børn ofte bliver snavsede og også kan komme til at kradses i såret.

Vi fraråder at De, så længe stingene sidder i, går i karbad, svømmehal, swimmingpool, boblebad samt havvand. Brusebad er i orden efter de første 24 timer. Efter brusebadet påsættes evt. nyt plaster og forinden skal der duptrørres i og omkring såret.

I Skadestuen er De behandlet med:

Stivkrampevaccination:

- Ja, og har fået udleveret et vaccinationskort
- Nej

Lokalbedøvelse:

- Ja
- Nej

Lettere smertestillende medicin:

- Ja
- Nej

De har fået udleveret: