

De har i dag d. _____ fået fjernet en skovflåt eller en rest efter en skovflåt.

Infektion / betændelse.

Der ses af og til betændelse ved bidstedet: hævelse, varme, rødme og smerter.

Hvis De observerer nogle af overstående symptomer, skal De henvende Dem til egen læge eller lægevagt.

En særlig pincet til fjernelse af skovflåt kan købes på apoteket.

I skadestuen er De behandlet med:

Stivkrampevaccination:

- Ja, og har fået et vaccinationskort .
- Nej.

De har fået udleveret:

Information om sygdomme, forårsaget af skovflåt

Borrelia.

Der går ca. 24 timer, inden skovflåten begynder at overføre evt. bakterier.

10 % af skovflåterne er smittet med Borrelia.

Det hyppigste symptom er et voksende hududslet, som ses efter få dage til fire uger efter biddet.

I sjældne tilfælde kan ses ledsymptomer, hjertebetændelse og/eller hjernehindebetændelse.

Smitte med bakterien kan behandles med antibiotika.

Søg egen læge hvis de er i tvivl om deres symptomer.

Neuroborreliose.

Bakterien kan i sjældne tilfælde inficere de indre organer, evt. uden forudgående hudsymptomer. Den kan angribe nervesystemet, hvor den primært kan medføre ansigtslammelser. Symptomerne kan være måneder om at vise sig. Behandles effektivt med antibiotika.

Tick-Borne Encephalitis (TBE).

1 % af alle skovflåter er smittet med en virus, som overføres til mennesker umiddelbart i forbindelse med biddet. De fleste personer får ingen gener heraf, men nogle enkelt udvikler hjernebetændelse.

Der findes en forebyggende vaccine mod TBE.

Kontakt egen læge hvis de er interesseret i denne vaccination.